

Cáncer de cuello de útero: Mendoza incorporó un test de VPH que se podrá hacer cada 5 años

09/03/2022



En el marco del Día de la Mujer, y tras una pandemia donde gran parte de la población femenina postergó sus estudios ginecológicos, **el Ministerio de Salud de Mendoza anunció la puesta en marcha de la implementación de los test de VPH** que sirven para detectar la presencia de los **virus del Papiloma Humano (VPH)**, que aumentan el riesgo de cáncer en el cuello del útero.

“Le estamos aportando a la provincia de Mendoza una calidad

diagnóstica fundamental con este test que es de aplicación sencilla, e inclusiva podremos ir avanzando hasta la realización del autotest, ya que incluso la mujer se lo puede hacer sola”, indicó la ministra de Salud, Ana María Nadal, durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

En la provincia se hará una toma de muestra doble. A la par del **test de VPH, se realizará una prueba de Papanicolaou**, que **sólo se leerá en caso de que el primer examen sea positivo**.

“El objetivo final de estas acciones es disminuir la morbimortalidad por cáncer de cuello uterino en la provincia a través de la implementación del test de VPH como método de tamizaje primario”, detalló Nadal.

En Mendoza mueren por año aproximadamente 70 mujeres por esta enfermedad y se detectan 200 nuevos casos, mientras que en la Argentina se diagnostican alrededor de 5.000 casos nuevos por año y fallecen 1.800 personas por esta enfermedad.

“Por eso, estamos dando un salto muy importante en la prevención de este cáncer agregando una nueva práctica. El test de VPH ofrece ventajas frente al PAP. Entre ellas, una mayor sensibilidad, **si da negativo recién se repite a los 5 años**, la posibilidad de auto toma para llegar a una población remota. En definitiva, queremos llegar al 2030 sin cáncer de cuello uterino en Mendoza, ya que es una enfermedad altamente prevenible”, finalizó Nadal.



¿Para qué sirve?

La prueba permite detectar ADN de Virus del Papiloma Humano, un virus que aumenta el riesgo de cáncer de en el cuello uterino. En el caso de que el test sea negativo, es decir, no

se detecte VPH en el cuello del útero, **el intervalo hasta el próximo test será de 5 años.**

Si el test de VPH detecta la presencia de VPH, el PAP permitirá saber si el virus provocó lesiones.

Pueden pasar en promedio 10 años desde que aparecen las primeras lesiones hasta que se conviertan en cáncer. Por este motivo, el cáncer de cuello de útero es una enfermedad altamente prevenible.

¿Cómo se realiza?

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación para realizar el test:

- Se introduce un pequeño aparato llamado espéculo en la vagina
- Se realiza la toma de muestra doble (PAP y Test de VPH)
- La muestra se envía en un tubito con un medio líquido para ser analizada en el laboratorio de VPH por un procesador automático. Esta muestra se envía junto con el vidrio del PAP, que sólo se leerá si el Test de VPH es positivo.

Quiénes lo realizarán

Los centros de salud y hospitales serán los encargados de las tomas. Se realizará la integración del laboratorio de VPH con los laboratorios de citología e histopatología.

El jefe del Programa de Cáncer de Mama y Cuello Uterino, Santiago Orrico, precisó que “la idea es contar con una oferta importante de efectores para que las mujeres puedan tener el servicio a mano”. Sin embargo, por el momento se empezará por el Gran Mendoza y luego se irá trasladando al resto del territorio.

Fuente: El Sol