

COVID- 19: con cuántos síntomas recomiendan hisoparse

10/04/2021

Regresaron las largas filas en los hospitales de gente que refiere tener síntomas tales como fiebre, tos y resfrío y decide realizarse un test para determinar si está o no contagiada.

Pese a que ya pasó un año desde que la pandemia se instaló en el mundo entero, aún surgen muchas dudas acerca de cuándo es necesario asistir a un nosocomio a hisoparse y con cuántos síntomas.

Los especialistas advierten que muchas personas que ya contrajeron el virus meses atrás, nuevamente están contagiados y eso se debe a que los anticuerpos no son duraderos, por ello, es posible la reinfección.



«Se decía que los anticuerpos tenían una duración de tres meses, pero en la práctica se está detectando otra realidad y por ello hay que estar muy atentos porque el virus está atacando nuevamente, sin distinción de si esa persona tuvo o no la enfermedad», dijo en *Viva la mañana* por Canal 9, la infectóloga Silvina Salvarredi.

Cuándo es necesario someterme a un hisopado

Desde que arrancó la pandemia, los profesionales manifestaban que con dos o tres síntomas característicos las personas debían asistir a los centros de testeos e hisoparse. Hoy la recomendación es la misma, sin embargo, muchos infectólogos están advirtiéndole que los médicos de guardia están desestimando algunos síntomas y no hisopan a los pacientes.

«Con al menos tres síntomas propios del coronavirus (fiebre, pérdida de olfato, pérdida de gusto y olfato, tos, diarrea, vómito, dolores de cabeza o musculares, entre otros) las personas deben realizarse un test», dijo Salvarredi.

Sin embargo, en la práctica no está ocurriendo, la especialista reconoció que algunos médicos que están de guardia desestiman algunos de los síntomas y envían a los sospechosos, con tos por ejemplo, a sus casas a la espera que surjan otras posibles alertas.

«Entiendo que lo hacen para no lograr un falso negativo, pero en realidad lo que tiene que hacer ese paciente es ir a su casa, aislarse, esperar entre 48 y 72 horas para ver si aparecen síntomas y allí sí regresar para ser hisopados», explicó.

Fuente: El Sol