

Durante la primera quincena de enero, más de 400 embarazadas mendocinas se aplicaron una dosis de VSR

18/01/2025



El **Virus Sincicial Respiratorio (VSR)** es el principal agente causal de infección respiratoria aguda en lactantes y niños/as pequeños. Por tal motivo, **es esencial que las mujeres embarazadas** se inmunicen para proteger a los bebés por nacer contra la bronquiolitis hasta el sexto mes de vida.

Ante esto, Mendoza puso en marcha una fuerte campaña y los resultados han sido muy positivos. De acuerdo con los datos oficiales, proporcionados por el Ministerio de Salud de la provincia, **durante la primera quincena de enero, unas 411 mujeres mendocinas, entre las 32 y 36 semanas de gestación se vacunaron contra el virus sincicial respiratorio.**

Se trata de un gran logro porque la vacuna protege a los bebés

por nacer contra la bronquiolitis hasta el sexto mes de vida. Los datos confirman, así mismo, que **el departamento que registró más aplicaciones fue Ciudad con 96 dosis**, seguido por Maipú con 58, Las Heras con 45 dosis aplicadas, San Rafael con 32, Luján de Cuyo con 27, Godoy Cruz con 23 y Guaymallén con 18.



Cómo acceder a las dosis

La dosis está destinada a **embarazadas entre las 32 y las 36 semanas de gestación** y es gratuita. Además, no se necesita orden médica para la aplicación.

Las que deseen acceder a la vacuna deberán concurrir a al centro de salud más cercano, hospital público o al Vacunatorio Central.

¿Qué es el virus sincicial

respiratorio?

El VSR es el principal agente causal de infección respiratoria aguda en lactantes y niños/as pequeños. Si bien la mayoría de estos casos corresponden a cuadros leves, se estima que el 20-30% puede desarrollar compromiso respiratorio bajo (bronquiolitis o neumonía) durante la primoinfección y evolucionar a formas potencialmente graves.

El VSR causa un tercio de las muertes en niñas y niños durante el primer año de vida.



¿Cómo se transmite este virus?

El VSR se transmite a través de las secreciones respiratorias (gotitas) que las personas infectadas diseminan cuando tosen o estornudan y por contacto directo.

Todos los años durante los meses de otoño/invierno, se produce un aumento en la circulación del VSR que genera un incremento en las consultas pediátricas ambulatorias y de las internaciones, especialmente de niños y niñas menores de 1 año.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas típicos son similares a los del resfriado común. Sin embargo, la infección por el VSR es la causa principal de bronquiolitis o neumonía en los lactantes menores de 6 meses.

Fuente: El Sol –
<https://www.elsol.com.ar/mendoza/durante-la-primer-quincena-de-enero-mas-de-400-embarazadas-mendocinas-se-aplicaron-una-dosis-de-vsr/>