

# Uno de cada 36 niños estadounidenses padecen distintos rasgos de autismo

02/03/2024



Uno de cada 36 niños estadounidenses padecen el trastorno del espectro autista (TEA), según un informe realizado por un organismo de ese país, el cual ratificó que un **diagnóstico temprano** es fundamental para tratar esa condición del neurodesarrollo.

Según el grupo de defensa Autism Speaks, el momento en que un niño recibe el diagnóstico puede variar **entre los 18 meses y los dos años de edad**.

Sin embargo, en muchos casos un diagnóstico de autismo puede confirmarse en una edad más avanzada durante la infancia, incluso algunas personas **reciben la confirmación de que padecen TEA siendo adultas**.

Por su parte, la **Academia Americana de Pediatría** (American

Academy of Pediatrics) aconseja que todos los niños se sometan a pruebas de detección del desarrollo y del comportamiento durante las visitas regulares al médico **a los nueve, 18 y 30 meses.**

**«Diagnosticar el trastorno del espectro autista [TEA] puede ser difícil porque no hay una prueba médica, como un análisis de sangre, para diagnosticar el trastorno»**, afirmó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Desde ese organismo recomendaron realizar un **seguimiento del desarrollo del niño**, observar qué tan pronto alcanza los hitos típicos del desarrollo, es clave. Estos hitos vinculados a la edad

incluyen las habilidades observadas en el juego, el aprendizaje, el habla, el comportamiento y el movimiento, según el informe publicado en el portal HealthDay.

«Un diagnóstico de TEA incluye varias afecciones que solían diagnosticarse por separado, como trastorno autista, trastorno generalizado del desarrollo no especificado (PDD-NOS) y síndrome de Asperger», señalaron desde el CDC.

NA